

Créer une prairie fleurie

Gestion différenciée, enrichissement, semis : la bonne méthode selon le terrain



Pollinisateurs
Biodiversité
Coût réduit



1 • Commencer : la gestion différenciée

La plupart des sols conservent une **banque de graines dormantes** de flore locale. Arrêter la tonte intensive et faucher tardivement (avec export) suffit souvent à faire émerger une prairie spontanée, sans semer et sans coût.

Toujours la première approche. Floraison progressive sur 2 à 3 ans.

2 • Enrichir sans labour si insuffisant

Si après 1 à 2 ans les graminées dominent encore, enrichir **sans retourner le sol**, par ordre de préférence :

- **Transfert de foin** d'une prairie locale voisine — méthode de référence
- **Sursemis** léger (Végétal Local) après scarification
- **Rhinanthe** (*Rhinanthus minor*) — affaiblit les graminées, en complément
- **Plants en godets** (Végétal Local) — effet rapide, en appoint

3 • Semer avec travail du sol — uniquement si le sol est dégradé

Réservé aux sols très appauvris ou imperméabilisés (ex-parking, ex-cour bitumée, terre nue compactée) ou à banque de graines détruite par des traitements chimiques. Préparation du sol et semis détaillés page 2.

La prairie fleurie transforme une pelouse tondue intensivement en un habitat riche pour les pollinisateurs, les insectes et la petite faune — tout en réduisant considérablement les coûts de gestion. C'est l'aménagement de renaturation le plus accessible et le plus impactant visuellement.

Chiffres clés

1-3 g
de graines / m²

10 m²
surface minimum

-70 %
coûts de tonte

2-3 ans
pour s'installer

1x / an
fauche tardive seulement

Pourquoi une prairie fleurie ?

- Réduit les coûts de tonte de **60 à 80 %**
- Crée un habitat pour **abeilles sauvages, papillons et bourdons**
- Améliore la biodiversité locale rapidement
- Stocke du carbone dans le sol
- Fort impact visuel positif pour les habitants
- Applicable à presque tous les espaces communaux



Bien choisir ses graines

Label Végétal Local

La garantie de plantes d'origine locale, génétiquement adaptées au territoire et à la faune locale. Toujours privilégier ce label.

 vegetal-local.fr · ofb.gouv.fr/vegetal-local

- Choisir un mélange adapté à sa **zone Végétal Local** (ex : Massif Armoricain, Bassin Parisien Nord, Zone Sud-Ouest, Massif Central, Alpes...) — recherche par commune sur vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche
- Viser **20 à 40 espèces minimum** pour un habitat riche

Préparer le sol (avant semis)

La prairie fleurie aime les sols pauvres

Ne pas fertiliser — un sol trop riche favorise les graminées. Plutôt que décaper, **appauvrir progressivement** par la fauche tardive avec export des résidus.

- Sursemis** (sol enherbé) : une simple **scarification légère** suffit à créer le contact graines-sol
- Semis complet** (sol dégradé ou nu) : décompacter et créer un lit de semences fin
- Décaper la terre végétale seulement si le sol est **très enrichi**, en dernier recours
- Éviter le désherbage chimique ; humidifier légèrement avant le semis si temps sec

Récolter ses propres graines

Pourquoi c'est la meilleure source

Les graines récoltées sur place sont **parfaitement adaptées au sol, au climat et à la faune locale**. Elles préservent la diversité génétique propre au territoire — ce qu'aucun fournisseur, même labellisé, ne peut garantir à ce niveau de précision.

- Récolter en août–septembre**, quand les tiges sont sèches et les graines se détachent au moindre frôlement
- Collecter** en secouant les tiges au-dessus d'un sac, ou poser un sac papier autour des inflorescences quelques jours avant récolte
- Sécher en fine couche sur du papier** à l'ombre, 2–3 semaines en remuant régulièrement. Trier pour éliminer les débris
- Stocker dans des enveloppes papier étiquetées** (espèce, lieu, date) au sec et à l'abri de la lumière
- Partager avec les communes voisines** — les graines locales sont un patrimoine commun du territoire

Réglementation

Récolte réglementée en milieu naturel — se limiter aux espaces communaux ou privés avec accord.

Mélanges de jardinerie : attention

Souvent composés d'espèces ornementales non locales (cosmos, coquelicots asiatiques...). Beaux mais sans valeur pour la faune locale, parfois invasifs. À éviter pour un projet écologique sérieux.

Semer et sursemmer

Meilleures périodes

Automne (sept.–oct.) : idéal, les graines passent l'hiver et germent au printemps

Printemps (mars–avril) : possible, arrosage plus important la 1re année

- Densité** : 1 à 3 g/m² selon les mélanges
- Mélanger les graines avec du **sable fin** pour une distribution homogène
- Semer par **temps calme**, sans vent
- Tasser légèrement **sans enfouir** — les graines ont besoin de lumière pour germer
- Surface minimum conseillée : **10 m²**

Entretenir

Quand faucher

Fauche unique idéale : **septembre–octobre**, après fructification — graines mûres, cycle des insectes bouclé.

Fauche en deux temps : diviser la prairie en deux moitiés. Faucher la moitié A cette année, laisser la moitié B debout. L'année suivante, inverser. Il reste toujours une zone refuge intacte.

- Hauteur de coupe** : 10–15 cm minimum — préserve insectes du sol, araignées et micromammifères
- Faucher en bandes parallèles**, jamais en spirale — les cercles concentriques piègent la faune sans issue de fuite
- Faucher lentement**, de préférence tôt le matin — reptiles moins actifs, faune encore à l'abri
- Laisser les résidus 24–48h sur place** avant export : les insectes s'échappent, les graines mûres tombent au sol
- Exporter ensuite les fanes** : les laisser se décomposer enrichirait le sol et favoriserait les graminées au détriment des fleurs
- Ne pas intervenir en cours de saison (avril–août)

Fournisseurs recommandés

Ecosem

Grand Ouest · Label VL

Végétal Local

vegetal-local.fr

CBN régional

Conseils adaptés au territoire

Fredon

Réseau Fredon France

★ À retenir

Toujours choisir Label Végétal Local — pas de mélanges de jardinerie

Fauche tardive en septembre, résidus exportés hors site

Faucher en deux temps pour maintenir un refuge toute l'année

Sol pauvre = prairie réussie — ne jamais fertiliser

Gestion différenciée d'abord ; floraison progressive sur 2 à 3 ans

Enrichir sans labour (transfert de foin, sursemis local) avant de semer